

NILOCIN® VORTE GEL

Brugsanvisning

Det anbefales at blødgøre vorten i lunkent vand i minimum 5 minutter inden behandlingen. Såfremt vorten er dækket af hård hud, kan vorten forsigtigt skrubes på overfladen. Den hårde hud fjernes forsigtigt. Fil ikke på vorten. Børn bør behandles af en voksen.

- 1) Fjern låget. Tryk låget ned og drej mod uret.
- 2) Påfør en dråbe gel på vorten med applikatoren 2 gange om dagen i 4 dage. Større vorter skal påføres mere end en dråbe for at dække hele vorten. For børn med små vorter reduceres behandlingsplanen til en applicering om dagen.
- 3) Låget skrues omhyggeligt på efter brug.
- 4) Lad gelen tørre i 10-15 minutter.
- 5) Gentag behandlingen i 4 dage.

Hvis vorten ikke er væk, gentages behandlingen efter en 4 dages pause. Behandlingen kan gentages op til 4 gange. Hele vorten skal dækkes og vær forsigtig med ikke at påføre gelen på sund hud. Opstår der ubehag eller smerte stoppes appliceringen. Opstår der en sviden eller brændende fornemmelse, eller er behandlingen ved et uheld appliceret på den sunde omgivende hud, skylles med koldt vand.

Overskrid ikke antallet af anbefalede applikationer.

Nilocin Vorte Gel opbevares i den originale emballage, ved 2-25°C, udenfor direkte sollys, og uden for børns synsfelt og rækkevidde. Må ikke benyttes efter udløbsdatoen eller 6 måneder efter første brug. Låget sættes omhyggeligt efter brug. Afskaffes i affaldsbøtte til farligt affald.

Forholdsregler

Kun til udvortes brug. Skal opbevares ude af syne og utilgængeligt for børn. Produktet indeholder et ætsende middel.

- Benyt ikke Nilocin til behandling af kønsvorter samt i ansigtsregionen.
- Undlad at bruge Nilocin, hvis du er allergiske eller overfølsom overfor indholdsstofferne. • Undgå kontakt med sund hud rundt om vorten.

→

- Udsæt ikke det behandlede område for sollys, så længe behandlingen pågår.
- Undgå kontakt med smykker, beklædningsgenstande etc., idet gelen er ætsende.
- Anvend ikke på ømme eller blødende vorter, blærer samt irriteret, betændt eller beskadiget hud. Hold pause med behandlingen indtil huden er restitueret.
- Anvend ikke på vorter med hår, modermærker, pigmenteret hud, eller i tilfælde af at du er i tvivl om hudens tilstand er en vorte.
- Nilocin er ikke egnet for diabetikere og personer med dårligt kredsløb.
- Det er bedre at påføre for lidt gel end for meget, for at undgå sår, blister, inflammationer, vævsdød, ar og kemiske forbrændinger.
- Konsulter læge, såfremt det behandlede område bliver rødt og smertefuldt eller betændt.
- Enkelt patient – flergangsbrug.
- Benyt ikke Nilocin i kombination med andre vorte behandlings produkter.
- Krads ikke skorpen på vorten af, den bør falde af naturligt.
- Gravide, ammende og personer som lider af en hudsygdom. bør konsultere egen læge inden brug.
- Benyt ikke til børn under 4 år, med mindre ordineret af læge.

***HVIS PRODUKTET VED ET UHELD KOMMER I ØJNENE, SKYL STRAKS ØJNENE
MED RIGELIGE MÆNGDER LUNKENT VAND OG GENTAG I 15 MINUTTER.
KONTAKT LÆGE ELLER SKADESTUE.***

Bivirkninger

Det er vigtigt at produktet anvendes som foreskrevet. Antallet af applikationer må ikke overskrides, idet dette kan medføre hudskader (se også indlægssedlen). En mild snurren eller brændende fornemmelse kan i visse tilfælde fornemmes i 10-15 minutter efter applicering. Ved overeksponering kan bivirkninger opstå. Stop med brug indtil huden er fuldt restitueret.

Alvorlige hændelser bør indberettes til Unigroup ApS og relevant myndighed.

Teknisk Data Inkluderer: 4 ml. Gel, samt indlægsseddel.

Ingredienser (INCI): I Trichloroacetic acid (TCA), Aqua, Glycerin, Cellulose, Cellulose gum, Benzoic Acid, Sodium benzoate. Registrering: Medicinsk udstyr, klasse IIa - NILOCIN® VORTE GEL